

Denk Pharma

PATIENT ALERT CARD | بطاقة تنبيه المريض

Roxaban Denk 10 mg

Roxaban Denk 15 mg

Roxaban Denk 20 mg

روكسابان دنك 20 مجم

روكسابان دنك 15 مجم

روكسابان دنك 10 مجم

احفظ هذه البطاقة معك في جميع الأوقات | Keep this card with you at all times

Present this card to every physician or dentist prior to treatment

قدم هذه البطاقة إلى أي طبيب أو طبيب أسنان قبل تلقي العلاج

I am under anticoagulation treatment with Roxaban Denk (rivaroxaban)

أنتلقى علاجًا مضادًا للتجلط باستخدام روكسابان دنك (ريفاروكسابان)

Name:

الاسم:

Address:

العنوان:

Birth date:

تاريخ الميلاد:

Weight:

الوزن:

معلومات لمقدمي الرعاية الصحية:

- ينبغي عدم استخدام قيم النسبة المعيارية الدولية (INR) لأنها ليست مقياسًا موثوقًا به لنشاط روكسابان دنك المضاد للتجلط.

ما الذي تعين على معرفته عن روكسابان دنك؟

- يعمل روكسابان دنك على زيادة سيولة الدم، ما يقيك من الإصابة بجلطات دموية خطيرة.
- يجب تناول روكسابان دنك وفقًا لتعليمات طبيبك بالضبط. لضمان أفضل حماية من جلطات الدم، لا تفوت أي جرعة أبدًا.
- يجب ألا تتوقف عن تناول روكسابان دنك دون التحدث أولاً إلى طبيبك، حيث قد يزيد خطر إصابتك بجلطات الدم.

- أخبر مقدم رعايتك الصحية عن أي أدوية أخرى تتناولها حاليًا، أو تناولتها مؤخرًا، أو تتوي البدء في تناولها، قبل البدء في تناول روكسابان دنك.
- أخبر مقدم رعايتك الصحية أنك تتناول روكسابان دنك قبل أي عملية جراحية أو إجراء جراحي.

متى ينبغي أن استشير مقدم رعايتي الصحية؟

عند تناول عامل مسيل للدم مثل روكسابان دنك، من المهم أن تعرف آثاره الجانبية المحتملة.

يُعد النزيف الأثر الجانبى الأكثر شيوعًا. لا تبدأ بتناول روكسابان دنك إذا كنت تعلم أنك معرض لخطر النزيف، دون مناقشة هذا

الامر أولاً مع طبيبك. أخبر مقدم رعايتك الصحية على الفور إذا كانت لديك أي علامات أو أعراض للنزيف مثل:

- الشعور بالألم
- التورم أو الانتعاج
- الصداع أو الدوخة أو الضعف
- كدمات غير عادية أو نزيف من الأنف أو نزيف من اللثة أو جروح تستغرق وقتًا طويلًا لوقف النزيف
- غزارة دم الحيض أو النزيف المهبلي بمعدل أكثر من المعتاد
- ظهور دم في البول قد يكون ورديًا أو بنيًا أو لون البراز أحمر أو أسود
- سعال دموي أو قيء دموي أو مادة تشبه حبيبات القهوة

كيف أتناول روكسابان دينك؟

- لضمان أفضل حماية:
- يمكن تناول روكسابان دنك 10 مجم مع أو بدون الطعام،
- يجب تناول روكسابان دنك 15 مجم مع الطعام،
- يجب تناول روكسابان دنك 20 مجم مع الطعام

أدوية أخرى/حالات مرضية أخرى:

أدوية أخرى/حالات مرضية أخرى:

In case of emergency, please notify:

في حالة الطوارئ، يرجى إخطار:

Doctor's name:

اسم الطبيب:

Doctor's phone:

هاتف الطبيب:

Please also notify: Relationship:

يُرجى إخطار أيضًا: العلاقة:

Name:

الاسم:

Phone:

الهاتف:

Information for health care providers:

- INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Roxaban Denk.

What should I know about Roxaban Denk?

- Roxaban Denk thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots.
- Roxaban Denk must be taken exactly as pre-scribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose**.
- You must not stop taking Roxaban Denk without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase.

- Tell your health care provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Roxaban Denk.
- Tell your health care provider that you are taking Roxaban Denk before any surgery or invasive procedure.

When should I seek advice from my health care provider?

When taking a blood thinner such as Roxaban Denk it is important to be aware of its possible side effects.

Bleeding is the most common side effect. Do not

start taking Roxaban Denk if you know you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor. Tell your health care provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness
- unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal

- blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

How do I take Roxaban Denk?

- To ensure optimal protection, Roxaban Denk – 10 mg can be taken with or without food, – 15 mg **must** be taken with food, – 20 mg **must** be taken with food.

50002746/001