

**Information à destination des professionnels de santé :**

- Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Roxaban Denk.

**Que faut-il savoir sur Roxaban Denk ?**

- Roxaban Denk fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- Roxaban Denk doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. **N'oubliez jamais de prendre votre traitement** afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- Vous ne devez jamais arrêter de prendre Roxaban Denk sans en parler d'abord à votre médecin, car le

risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre Roxaban Denk.
- Informez votre médecin que vous êtes traité par Roxaban Denk avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

**Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien ?**

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Roxaban Denk, il est important de connaître les éventuels effets indésirables.

Les saignements sont l'effet indésirable le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Roxaban Denk sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin. Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- douleurs
- gonflement ou sensations d'inconfort
- maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus

abondants que d'ordinaire

- sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

**Comment dois-je prendre Roxaban Denk ?**

- Pour garantir une protection optimale, Roxaban Denk – 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas, – 15 mg **doit** être pris au cours des repas, – 20 mg **doit** être pris au cours des repas.

**PATIENT ALERT CARD | CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT**

- Roxaban Denk **10 mg**    Roxaban Denk **15 mg**    Roxaban Denk **20 mg**

**Keep this card with you at all times | Gardez toujours cette carte sur vous.**

**Present this card to every physician or dentist prior to treatment | Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement.**

**I am under anticoagulation treatment with Roxaban Denk (rivaroxaban) | Je suis sous traitement anticoagulant par Roxaban Denk (rivaroxaban).**

Name | Nom :

Address | Adresse :

Birth date | Date de naissance :

Weight | Poids :

Other medicines/conditions | Autres médicaments/Pathologies :

**In case of emergency, please notify | En cas d'urgence, veuillez prévenir :**

Doctor's name | Nom du médecin :

Doctor's phone | Téléphone du médecin :

**Please also notify | Veuillez aussi prévenir :** Relationship | Lien avec le patient : \_\_\_\_\_

Name | Nom :

Phone | Téléphone :

**Information for health care providers:**

- INR values should not be used as they are not a dependable measure of the anticoagulant activity of Roxaban Denk.

**What should I know about Roxaban Denk?**

- Roxaban Denk thins the blood, which prevents you from getting dangerous blood clots.
- Roxaban Denk must be taken exactly as prescribed by your doctor. To ensure optimal protection from blood clots, **never skip a dose.**
- You must not stop taking Roxaban Denk without first talking to your doctor as your risk of blood clots may increase.

- Tell your health care provider about any other medicines you are currently taking, took recently or intend to start taking, before you start Roxaban Denk.
- Tell your health care provider that you are taking Roxaban Denk before any surgery or invasive procedure.

**When should I seek advice from my health care provider?**

When taking a blood thinner such as Roxaban Denk it is important to be aware of its possible side effects. Bleeding is the most common side effect. Do not

start taking Roxaban Denk if you know you are at risk of bleeding, without first discussing this with your doctor. Tell your health care provider straight away if you have any signs or symptoms of bleeding such as the following:

- pain
- swelling or discomfort
- headache, dizziness or weakness
- unusual bruising, nosebleeds, bleeding of gums, cuts that take a long time to stop bleeding
- menstrual flow or vaginal bleeding that is heavier than normal

- blood in your urine which may be pink or brown, red or black stools
- coughing up blood, or vomiting blood or material that looks like coffee grounds

**How do I take Roxaban Denk?**

- To ensure optimal protection, Roxaban Denk – 10 mg can be taken with or without food, – 15 mg **must** be taken with food, – 20 mg **must** be taken with food.